



Vinya

Avís de tractament per a la D.O. Raïm de taula embossada del Vinalopó

Cuc del raïm (*Lobesia botrana*): 2^a generació

El seguiment del cicle biològic d'esta plaga es realitza com en anteriors campanyes, a través del Servei de Sanitat Vegetal en col·laboració amb els tècnics de Atrias de la zona. Este seguiment es realitza a través de paranyes sexuals de monitoratge, a més de l'observació directa de raïms en camp.

El vol de la segona generació va començar a detectar-se durant l'última desena del mes de maig, i ja en els primers dies de juny s'han detectat les primeres postes sobre raïms. Esta rapidesa en el desenrotllament de la plaga és conseqüència de les altes temperatures que s'han donat en els últims dies en la zona.

Amb les condicions meteorològiques que s'estan produint es preveu que les primeres eclosions es produïsquen en 4-5 dies. Per tot això, el Servei de Sanitat Vegetal recomana **realitzar un tractament insecticida** per a controlar esta plaga. Este tractament s'haurà d'efectuar **entre els dies 6 i 10 de juny, tots dos inclosos**.

En les parcel·les en les quals s'està practicant la biotècnica de la confusió sexual no s'està observant presència significativa de la plaga, per la qual cosa no és necessari realitzar cap tractament insecticida contra esta plaga.



Ou blanc sobre baia, segona generació

Silla (València), 02 de juny de 2025

