



Vinya

Avís de tractament per a la Zona Centre de València, Raïm de Taula Embossada del Vinalopó i la Vall d'Albaida

Cuc del raïm (*Lobesia botrana*): 2a Generació

El seguiment del cicle biològic del cuc de raïm s'està duent a terme, com en anys anteriors, des del Servei de Sanitat Vegetal, en col·laboració amb els tècnics de vinya de Cooperatives Agroalimentàries CV de València i Alacant.

En la zona Centre de la província de València (des del Marquesat de Llombai fins a Villar del Arzobispo), així com en la zona de la Raïm de Taula Embossada del Vinalopó i la Vall d'Albaida, van començar a observar-se adults de la 2a generació els últims dies del mes de maig, arribant al màxim de captures a final de la primera desena de juny.

Durant la prospecció de postes realitzada a meitat de juny ja es va observar la presència de postes sobre raïms, predominant els ous de color groc.

El nivell de plaga es troba al voltant d'un 35% de raïms atacats, per la qual cosa des del Servei de Sanitat Vegetal es recomana realitzar un tractament insecticida contra aquesta plaga.

Les **dates idònies** per a la realització d'aquest **tractament** són **entre el 17 i el 21 de juny, ambdós inclosos**.

El vol d'adults d'aquesta segona generació està sent molt curt, per la qual cosa amb un únic tractament serà suficient per a un bon control de la plaga.

Aquelles parcel·les en les quals s'està practicant la confusió sexual, no és necessària la realització d'aquest tractament insecticida, ja que el grau d'atac observat en aquestes parcel·les està molt per sota del llindar de tractament.



Ou blanc sobre raïm



Ou groc sobre baia

Mildiu (*Plasmopara viticola*)

Les condicions meteorològiques per a l'atac d'aquest fong han estat molt favorables en les últimes setmanes. En línies generals, s'observa un bon control de la malaltia, però s'observen algunes taques aïllades que podrien desenvolupar noves contaminacions.

Per aquest motiu, recomanem seguir amb la protecció de la vinya davant d'aquest fong, utilitzant fungicides del grup dels penetrants i/o les seves mescles.



Taca d' oli sobre fulla: contaminació primària

Oïdi (*Uncinula necator*)

Ens trobem en un període d'alt risc per a l'atac d'aquest fong. Per això, es recomana continuar mantenint la protecció de la vinya.



Oïdi sobre fulles



Primers símptomes d'oïdi en raïm

NOTA: Per a una informació més detallada sobre les matèries actives a utilitzar en el control dels paràsits esmentats, els recomanem posar-se en contacte amb els tècnics de les zones, o amb el Servei de Sanitat Vegetal.

També poden realitzar la consulta directament en el següent enllaç:

<https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb>

Silla (València), 16 de juny de 2023

