



Vinya

Avis de tractament per a la zona la Vall d'albaida

Cuc del raïm (*Lobesia botrana*): 3a Generació

La corba de vol de la 3a generació de la polilla del raïm es va iniciar al principi de l'última setmana de juliol en aquesta zona vitícola.

Les primeres postes sobre raïms han estat detectades a principis d'aquesta setmana, observant-se ous blancs i grocs en igual proporció.



Com en altres zones, s'observa un esglaonament en el cicle biològic de la plaga. Així, s'observen alhora adults en trampes, ous en raïms i fins i tot larves de la 2a generació.

Per tot això, el Servei de Sanitat Vegetal recomana realitzar un tractament insecticida contra aquesta plaga. Les dates més adequades per a la realització del **tractament són des del 5 al 9 d'agost, ambdós inclosos.**

Com a conseqüència de l'esglaonament abans esmentat, es recomana repetir el tractament passada la persistència del producte emprat.

Finalment, en aquelles parcel·les en les quals s'està practicant la biotècnica de la confusió sexual, no es recomana realitzar cap tractament insecticida contra aquesta plaga, ja que els nivells de plaga detectats es troben per sota del llindar de tractament establert a la Guia de Gestió Integrada.

Ou blanc sobre raïm.

Míldiu i oïdi (*Plasmopara*, *Erysiphe necator*)

En general, s'observa un bon control d'aquestes malalties a les vinyes d'aquesta zona vitícola. A partir de l'enver aquestes malalties ja no ataquen la planta, per la qual cosa només seria recomanable tractar-les si s'observen símptomes actius d'alguna d'elles.

Podridura grisa (*Botrytis cinérea*)

Es recomana realitzar un tractament preventiu contra aquesta malaltia, ja que les possibles ferides de polilla o els grans rajats per l'oïdi seran les principals portes d'entrada per a les espores d'aquest fong causant de les posteriors podridures del raïm. Preferentment s'aplicarà en el primer tractament, (tot i que es pot aplicar en tots dos), però, en qualsevol cas, sempre caldrà respectar el termini de 21 dies entre l'últim tractament i la verema, per evitar problemes en la fermentació dels mostos.



Focus de Botrytis en varietat blanca

NOTA: Per a una informació més detallada sobre les matèries actives a utilitzar en el control dels paràsits esmentats, els recomanem consultar el Butlletí d'Avisos núm. 8 de juny de 2023. O bé, posar-se en contacte amb els tècnics de les zones, o amb el Servei de Sanitat Vegetal.

També poden realitzar la consulta directament en el següent enllaç:

<https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb>

Silla (València), 2 d'agost de 2023

