Viña

Aviso de tratamiento para la zona centro de Valencia

Montroi, Real de Montroi, Montserrat, Turis, Godelleta, Cheste, Chiva, Pedralba, Casinos, Villar del Arzobispo

Polilla del racimo (*Lobesia botrana*): 3ª Generación

La curva de vuelo de la 3ª generación de la polilla del racimo se inició durante la tercera semana del mes de julio, siendo el nivel de capturas en algunos puntos de control bastante elevados, si bien en otros, como el caso de Villar del Arzobispo son más normales.
Se acaban de detectar las primeras puestas sobre racimos predominando los huevos blancos sobre los demás, si bien, ya se ha observado alguno de color amarillo. Con las temperaturas que se están dando, el ciclo biológico de la plaga se adelantará con mucha probabilidad.
El nivel de plaga observado está alrededor del 20 % de racimos con puesta, lo que para esta tercera generación y en este momento inicial de la misma, supone un nivel de plaga significativamente elevado.
También se observa un escalonamiento en el vuelo de adultos y puesta de huevos sobre las bayas, ya que se están observando al mismo tiempo, adultos en trampas, huevos sobre bayas e incluso larvas de tercera y cuarta edad de la 2ª generación.
Por todo ello, desde el Servicio de Sanidad Vegetal se recomienda la realización de un **tratamiento insecticida** para controlar esta plaga. Este tratamiento se deberá realizar **entre el 29 de julio y el 2 de agosto, ambos inclusive**. Como consecuencia del escalonamiento de vuelo y puesta antes mencionado, se recomienda la repetición del tratamiento, pasada la persistencia del producto empleado, especialmente en variedades de recolección tardía. En cualquier caso, se deberá tener muy en cuenta el plazo de seguridad del producto empleado, para evitar problemas de residuos en vendimias.
Por último, las parcelas en las que se practica la confusión sexual, en líneas generales, presentan un nivel de plaga por debajo del umbral de tratamiento, por lo que no es necesario realizar ningún tratamiento químico contra esta plaga en dichas parcelas.

Daños de polilla de 3ª generación.

Mildiu (*Plasmopara viticola*)

Aunque de forma generalizada se ha obtenido un buen control de la enfermedad, se observa en algunas viñas aisladas algunas manchas de mildiu en las últimas hojas de los sarmientos, e incluso algunos casos de mildiu larvado.

Por ello, recomendamos realizar un tratamiento fungicida con un producto de contacto, en aquellas parcelas donde se observen estos síntomas de la enfermedad. Con ello evitaremos la aparición del "mildiu larvado", el cual, con buenas condiciones meteorológicas puede causar graves problemas en la próxima campaña, así como defoliaciones prematuras de las cepas.

Mildiu en mosaico.
Reservorio de la enfermedad para primeras contaminaciones de la próxima campaña.

Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)

Se recomienda realizar un tratamiento preventivo contra esta enfermedad, ya que las posibles heridas de polilla o los granos rajados por el oídio serán las principales puertas de entrada para las esporas de este hongo causante de las posteriores podredumbres del racimo. Preferentemente se aplicará en el primer tratamiento (aunque se puede aplicar en los dos), pero, en cualquier caso, siempre habrá que respetar el plazo de 21 días entre el último tratamiento y la vendimia, para evitar problemas en la fermentación de los mostos.

Foco de botritis en uva blanca.

Oídio (*Erysiphe necator)*

Si bien se observa un buen control de la enfermedad de manera generalizada, todavía se observan algunos granos con síntomas típicos de la enfermedad. En estos casos, y aunque nos encontremos a inicio de envero, recomendamos realizar un tratamiento curativo contra la enfermedad.

En el caso de no observarse estos síntomas, no es necesario realizar ningún tratamiento fungicida contra el hongo, ya que éste no atacará a partir del envero.

Granos rajados como consecuencia de un ataque de oídio.

Mosquito Verde (*Empoasca vitis /Jacobiasca lybica*)

Se están observando con mayor intensidad ataques de esta plaga. Si se supera el umbral de tratamiento (1 insecto/hoja), recomendamos realizar un tratamiento específico contra esta plaga.

NOTA: Para una información más detallada sobre las materias activas a utilizar en el control de los parásitos mencionados, les recomendamos ponerse en contacto con los técnicos de las zonas o con el Servicio de Sanidad Vegetal.
También pueden consultar el boletín de avisos nº 8 de junio 2023 o directamente en el siguiente enlace: https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb

Silla (Valencia) 27 de julio de 2023