Viña

Aviso de tratamiento para la zona Terres dels Alforins

Moixent, Ontinyent, La Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins

Polilla del racimo (*Lobesia botrana*): 3ª Generación

Durante la última semana de julio comenzaron a observarse los primeros adultos de la tercera generación de la polilla del racimo en los viñedos más precoces de esta zona vitivinícola.

En la primera semana de agosto ya se detectaron las primeras puestas sobre racimos, observándose huevos blancos y amarillos a partes iguales. Las primeras eclosiones se prevé que se produzcan a finales de esta semana en las zonas más precoces, observándose un desfase en el ciclo biológico de la plaga de aproximadamente 6-8 días entre las zonas más cálidas y las más tardías.

Por todo ello, el Servicio de Sanidad Vegetal recomienda realizar un tratamiento insecticida para controlar esta plaga. Este **tratamiento** se realizará **entre los días 5 y 9 de agosto**, ambos inclusive, en los viñedos de Ontinyent, Moixent y La Font de la Figuera, mientras que los viñedos de Fontanars dels Alforins se tratarán entre los días **9 y 13 de agosto**, ambos inclusive.

Como en el resto de las zonas, se observa un escalonamiento en las curvas de vuelo y puesta, por lo que recomendamos repetir el tratamiento pasada la persistencia del producto empleado, especialmente en las variedades de recolección tardía como la monastrell. De la misma manera, como las vendimias se están adelantando este año, habrá variedades en las que solamente será necesario un único tratamiento, e incluso ninguno, dependiendo de las fechas de la vendimia.

Por último, en las parcelas en las que se practica la biotécnica de la confusión sexual no se recomienda la aplicación de ningún insecticida para controlar la plaga, ya que los niveles de plaga observados son inferiores al umbral de tratamiento.



Huevo en cabeza negra. Se observa en el interior la larva a punto de eclosionar

Mosquito verde (*Empoasca vitis /Jacobiasca lybica*)

Se están observando con mayor intensidad ataques de esta plaga. Sin embargo, los síntomas que se observan en estos momentos representan daños estéticos y no provocarán, por lo general, mermas ni en el grado, ni

en el color del producto final. No obstante, si se supera el umbral de tratamiento (2 insectos/hoja), podremos realizar un tratamiento específico contra esta plaga para rebajar población.



Síntomas de mosquito verde en hoja de variedad tinta

Podredumbre gris (*Botrytis cinérea*)

Se recomienda realizar un tratamiento preventivo contra esta enfermedad, ya que las posibles heridas de polilla o los granos rajados por el oídio serán las principales puertas de entrada para las esporas de este hongo causante de las posteriores podredumbres del racimo. Preferentemente se aplicará en el primer tratamiento, (aunque se puede aplicar en los dos), pero, en cualquier caso, siempre habrá que respetar el plazo de 21 días entre el último tratamiento y la vendimia, para evitar problemas en la fermentación de los mostos.

Foco de botritis en variedad tinta

NOTA: Para una información más detallada sobre las materias activas a utilizar en el control de los parásitos mencionados les recomendamos consultar el boletín de avisos núm. 8, junio 2023 o bien ponerse en contacto con los técnicos de las zonas, o con el Servicio de Sanidad Vegetal. También pueden realizar la consulta directamente en el siguiente enlace: https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb

Silla (Valencia), 4 de agosto de 2023