Viña

Aviso de tratamiento para la zona Terres dels Alforins

Moixent, Ontinyent, La Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins

Polilla del racimo (*Lobesia botrana*): 2ª Generación

Los primeros adultos de la 2ª generación de la polilla del racimo en esta zona vitícola fueron detectados a mediados del mes de junio.

Estos adultos comenzaron a realizar la puesta sobre los racimos a principios de la última decena del mes. En concreto, los primeros huevos blancos fueron observados el día 20 de junio.

El nivel de puesta no está siendo muy elevado, por lo general, pero se supera el umbral de tratamiento establecido para esta 2ª generación (10% de racimos con puestas).

Por último, el desfase en el ciclo biológico de la plaga entre los parajes más cálidos y los más frescos de esta zona, no es tan significativo como en otras campañas.

Por todo ello, el Servicio de Sanidad Vegetal recomienda realizar un tratamiento insecticida contra esta plaga en esta zona vitícola. Las fechas indicadas para la **realización del tratamiento** son **desde el 28 de junio al 4 de julio, ambos inclusive.**

Los viñedos de **La Font de la Figuera, Moixent y Ontinyent**, se deberán tratar durante **los primeros días** de este período, mientras que las viñas de **Fontanars dels Alforins** se tratarán durante los **últimos días** del mencionado período.

En los viñedos en los que se practica la biotécnica de la confusión sexual, no es necesario realizar ningún tratamiento insecticida contra esta plaga, ya que los niveles de ataque de la plaga en estas viñas se encuentran por debajo del umbral de tratamiento.

Huevo blanco recién puesto

Mildiu (*Plasmopara viticola*)

En general, se observa un buen control de la enfermedad, sin embargo, las condiciones meteorológicas han continuado siendo favorables para el desarrollo del hongo, y además se acaban de detectar las primeras manchas de mildiu en viñedos de Moixent.

Por todo ello, se recomienda mantener la protección del viñedo frente a esta enfermedad. En este caso, por la fenología de la viña, se recomienda la utilización de fungicidas pertenecientes a los grupos "Penetrantes" o de "Fijación a las ceras cuticulares".

Oídio *(Erysiphe necator)*

Nos encontramos en un período muy sensible al ataque de este hongo. Además, se han observado las primeras contaminaciones ascospóricas en hojas. Estas contaminaciones son el trampolín para las posteriores contaminaciones de oídio en los racimos. Por estos motivos, recomendamos mantener la protección del viñedo frente al ataque de este hongo.

Oidio: contaminación ascospórica

NOTA: Para una información más detallada sobre las materias activas a utilizar en el control de los parásitos mencionados les recomendamos ponerse en contacto con los técnicos de las zonas, o con el Servicio de Sanidad Vegetal. También pueden realizar la consulta directamente en el siguiente enlace: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro-productos/

Silla (Valencia), 23 de junio de 2023