Viña
Aviso de tratamiento para la zona Utiel-Requena

Polilla del racimo *(Lobesia botrana):* 3ª Generación

Los primeros adultos de la 3ª generación de la polilla del racimo se detectaron durante la última semana del mes de julio en los diferentes puntos de control situados en esta zona vitícola. Los primeros huevos sobre racimos se observaron a finales de la primera semana de agosto y a principios de la segunda semana ya predominaban los huevos amarillos.

En la mayoría de los puntos observados se sobrepasa el umbral de tratamiento situándose el nivel de plaga en un 10-15% de racimos con puesta e incluso en algunos puntos concretos de los términos de Utiel o Caudete de las Fuentes, el nivel de puestas sobre racimos es significativamente elevado.

A diferencia de otras campañas, el desfase del ciclo biológico de la plaga entre las zonas más cálidas y las más tardías es muy pequeño, por lo que, todas las zonas se deberán tratar prácticamente al mismo tiempo.

Por todo ello, el Servicio de Sanidad Vegetal recomienda realizar un tratamiento insecticida para controlar esta plaga. Este **tratamiento** se realizará entre los días **12 y 17 de agosto**, ambos inclusive.

Se observa un escalonamiento del ciclo biológico de la plaga por lo que en aquellas variedades de recolección tardía (a partir del 20 de septiembre), se debería repetir el tratamiento pasada la persistencia del producto empleado.

Por último, en aquellas parcelas en la que se practica la biotécnica de la confusión sexual, no es necesario realizar ningún tratamiento insecticida contra la plaga, ya que, en ellas, el nivel de plaga observado se encuentra por debajo del umbral de tratamiento establecido en la Gestión Integrada de Plagas para Uva de transformación.

Racimo de bobal con varias puestas en las bayas

Mildiu y Oidio (*Plasmopara viticol*, *Erisyphe necator*)

A partir del envero estas enfermedades ya no atacan a la planta, por lo que solo sería recomendable tratarlas si se observan síntomas activos de alguna de ellas.

Podredumbre gris (Botrytis cinérea)

Se recomienda realizar un tratamiento preventivo contra esta enfermedad, ya que las posibles heridas de polilla o los granos rajados por el oídio serán las principales puertas de entrada para las esporas de este hongo causante de las posteriores podredumbres del racimo. Preferentemente se aplicará en el primer tratamiento, (aunque se puede aplicar en los dos), pero, en cualquier caso, siempre habrá que respetar el plazo de 21 días entre el último tratamiento y la vendimia, para evitar problemas en la fermentación de los mostos.

Foco de botritis sobre Macabeo, originado por ataque de polilla

Daños indirectos de polilla: podredumbre sobre racimos

NOTA: Para una información más detallada sobre las materias activas a utilizar en el control de los parásitos mencionados les recomendamos consultar el Butlleti d'Avisos núm. 8, de junio de 2023.
O bien, ponerse en contacto con los técnicos de la zonas, o con el Servicio de Sanidad Vegetal.
También pueden realizar la consulta directamente en el siguiente enlace:
https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb

Silla (Valencia), 11 de agosto de 2023