

Vinya

Avís de tractament zona Utiel-Requena

Cuc del raïm (*Lobesia botrana*): 3a Generació

Els primers adults de la 3a generació del cuc del raïm es van detectar durant l'última setmana del mes de juliol en els diferents punts de control situats en aquesta zona vitícola. Els primers ous sobre raïms es van observar a finals de la primera setmana d'agost i a principis de la segona setmana ja predominaven els ous grocs.

En la majoria dels punts observats se sobrepassa el llindar de tractament situant-se el nivell de plaga en un 10-15% de raïms amb posta i fins i tot en alguns punts concrets dels termes d' Utiel o Caudete de las Fuentes, el nivell de postes sobre raïms és significativament elevat.

A diferència d'altres campanyes, el desfasament del cycle biològic de la plaga entre les zones més càlides i les més tardanes és molt petit, per la qual cosa, totes les zones s'hauran de tractar pràcticament alhora.

Per tot això, el Servei de Sanitat Vegetal recomana realitzar un tractament insecticida per controlar aquesta plaga. Aquest **tractament** es realitzarà entre els dies **12 i 17 d' agost**, ambdós inclosos.

S'observa un esglaonament del cycle biològic de la plaga pel que en aquelles varietats de recol·lecció tardana (a partir del 20 de setembre), s'hauria de repetir el tractament passada la persistència del producte emprat.

Finalment, en aquelles parcel·les en les quals es practica la biotècnica de la confusió sexual, no és necessari realitzar cap tractament insecticida contra la plaga, ja que, en elles, el nivell de plaga observat es troba per sota del llindar de tractament establert en la Gestió Integrada de Plagues per a raïm de transformació.



Raïm de bobal amb diverses postes a les baies

Míldiu i Oïdi (*Plasmopara viticola*, *Erysiphe necator*)

A partir del verol aquestes malalties ja no ataquen la planta, per la qual cosa només seria recomanable tractar-les si s'observen símptomes actius d'alguna d'elles.

Podridura grisa (*Botrytis cinérea*)

Es recomana realitzar un tractament preventiu contra aquesta malaltia, ja que les possibles ferides de cuc del raïm o els grans rajats per l'oïdi seran les principals portes d'entrada per a les espores d'aquest fong causant de les posteriors podridures del raïm. Preferentment s'aplicarà en el primer tractament, (tot i que es pot aplicar en tots dos), però, en qualsevol cas, sempre caldrà respectar el termini de 21 dies entre l'últim tractament i la verema, per evitar problemes en la fermentació dels mostos.



Focus de botritis sobre Macabeu, originat per atac del cuc del raïm

Danys indirectes del cuc:
podridura sobre raïms



NOTA: Per a una informació més detallada sobre les matèries actives a utilitzar en el control dels paràsits esmentats els recomanem consultar el Butlletí d'Avisos núm. 8, de juny de 2023.

O bé, posar-se en contacte amb els tècnics de la zona, o amb el Servei de Sanitat Vegetal.

També poden realitzar la consulta directament en el següent enllaç:

<https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb>

Silla (València), 11 d'agost de 2023

