



Vinya

Avís de tractament per a la zona Utiel-Requena

Cuc del raïm (*Lobesia botrana*): 2a Generació

Els primers adults de la 2a generació del cuc del raïm van ser detectats en iniciar-se la tercera desena del mes de juny en les trames de monitoratge utilitzades pel Servei de Sanitat Vegetal, els tècnics de cooperatives de la zona, així com els tècnics de la D.O. Utiel -Requena.

En general, les captures no estan sent gaire elevades i es preveu que el màxim de captures es produeixi en l'última setmana de juny.

En aquesta darrera setmana ja s'han detectat les primeres postes sobre les zones més precoces de la comarca, predominant els ous blancs a l'inici de la setmana i ja es van veure alguns grocs a meitat de la setmana. En general, tot i que el nivell de postes no és gaire elevat, se sobrepassa el llindar de tractament en tots els punts de control de la zona.

També s'observa una diferència o desfasament en el cicle biològic de la plaga entre les zones més precoces i les més tardanes, d'uns 8-10 dies.

Per tot això, el Servei de Sanitat Vegetal recomana la realització d' un tractament insecticida contra aquesta plaga. Aquest **tractament** es realitzarà entre els dies **1 i 9 de juliol**, ambdós inclosos. Les vinyes situades a les **zones més precoces** (Los Ruices, Casas de Eufemia, Los Duques, La Portera, Campo Arcís, Los Marcos, Las Monjas...), es tractaran en els **primers dies del període recomanat**, mentre que les vinyes de les **zones més tardanes** (Villargordo, Fuenterrables, Camporrobles, Sinarcas...), es recomana tractar-les en els **darrers dies de l' esmentat període**.

Finalment, els informem que en les vinyes en les quals es practica la biotècnica de la confusió sexual, els nivells de plaga estan sent baixos, no aconseguint-se el llindar de tractament en la immensa majoria d'elles. Per això, no es recomana la realització de cap tractament insecticida en aquestes vinyes.



Detall d'ou groc sobre baia

Ou blanc sobre raïm, mida real



Míldiu (*Plasmopara viticola*)

En general, s'observa un bon control d'aquesta malaltia en la majoria de les vinyes d'aquesta zona vitícola. No obstant això, en els últims dies continuen produint-se fenòmens de tempestes aïllades que poden provocar l'aparició de la malaltia en forma de taques d'oli en fulles, i fins i tot míldiu larvat en raïms. De fet, aquesta setmana s'acaben de detectar les primeres taques d'oli, si bé, en algunes vinyes aïllades i no de forma generalitzada.

Per tot això, es recomana mantenir la protecció de la vinya davant aquesta malaltia. En aquest cas, per la fenologia de la vinya, es recomana la utilització de fungicides pertanyents als grups "Penetrants" o de "Fixació a les ceres cuticulars".



Fort atac de míldiu en floració



Atac de míldiu en fase de quallat

Oïdi (*Erysiphe necator*)

Ens trobem en un període molt sensible a l'atac d'aquest fong. A més, s'han observat les primeres contaminacions ascospòriques en fulles. Aquestes contaminacions són el trampolí per a les posteriors contaminacions d'oïdi en els raïms. Per aquests motius, recomanem mantenir la protecció de la vinya davant l'atac d'aquest fong.



Contaminacions ascospòriques en fulla

NOTA : Per a una informació més detallada sobre les matèries actives a utilitzar en el control dels paràsits esmentats els recomanem posar-se en contacte amb els tècnics de les zones, o amb el Servei de Sanitat Vegetal.

També poden realitzar la consulta directament en el següent enllaç:

<https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb>

Silla (València), 30 de juny de 2023

