



## Vinya

### Avís de tractament per a la zona de la D.O. Alacant

#### Cuc del raïm (*Lobesia botrana*): 3a Generació


Els primers adults de cuc del raïm de la 3a generació s'han detectat en els primers dies del mes d'agost. Les captures inicials no són molt elevades, però això no vol dir que el nivell de postes i per tant el grau d'atac no vaja a ser significatiu.

En els paratges més càlids ja s'han detectat les primeres postes sobre raïm, les quals, lògicament són de color blanc. Es preveu que continuen les postes sobre raïms i les primeres eclosions començaran a mitjan agost.

Per tot això, el Servei de Sanitat Vegetal **recomana realitzar un tractament** contra esta plaga. Este tractament **es realitzarà entre els dies 15 i 20 d'agost, tots dos inclosos**.

La varietat monastrell, de recol·lecció tardana, requerirà l'aplicació d'un segon tractament, per l'escalonament del cicle biològic de la plaga.

Finalment, en les parcel·les en les quals es practica la biotècnica de la confusió sexual no es recomana cap aplicació insecticida contra esta plaga, ja que de forma generalitzada no s'arriba al llindar de tractament.



Ous de *Lobesia botrana* sobre baia

### **Mosquit verd (*Empoasca vitis*, *Jacobiasca lybica*)**

Si bé els nivells de plaga d'esta campanya no són els aconseguits en la campanya anterior, en el moment de realitzar el tractament contra la tercera generació de cuc del raïm es preveu que s'aconsegueixca el llindar de tractament, per la qual cosa **es recomana realitzar una aplicació insecticida** contra esta plaga per a evitar defoliacions prematures

### **Podridura grisa (*Botrytis cinerea*)**

**Es recomana una aplicació fungicida contra este fong** per a previndre podridures indesitjades, que provocaran una mala qualitat en el producte final.

Esta aplicació es podrà realitzar en el primer o en el segon passe de cuc del raïm, però els recordem que l'últim tractament antibotritis s'ha de realitzar com a mínim, 21 dies abans de la verema, per a evitar problemes en la fermentació dels mostos.



Danys de *Botritis* sobre raïm blanc

#### **NOTES:**

- Per a una informació més detallada poden consultar amb els tècnics de la zona o amb el Servei de Sanitat vegetal.
- Les matèries actives que es poden utilitzar per al control dels paràsits nomenats en este avís les poden consultar en el [Butlletí d'Avísos núm. 11, de juny de 2025](#)
- Finalment, tinguen en compte que es realitzaran tractaments fitosanitaris prop de la verema, per la qual cosa és necessari tindre en compte el termini de seguretat dels productes emprats.

Silla (València), 12 d'agost de 2025

