CEREZO

Mosca de las alas manchadas

(Drosophila suzukii)

En las diferentes zonas donde se está realizando seguimiento de la *Drosophila suzukii*, se está detectando la presencia de poblaciones de este insecto.

Se recuerda que al comienzo de la cosecha los ataques suelen ser más intensos y frecuentes y su tratamiento será especialmente necesario en parcelas con ataque en años anteriores y que dejaron cerezas sin cosechar el año pasado (daños de mosca o rajado, falta de rentabilidad ...)

La incidencia de esta plaga es mayor en los huertos cálidos próximos a cauces de agua (arroyos, gargantas, fuentes...) o próximos a refugios invernales (pinos, madroños,zarzales...) y suele ser donde primero se detectan los daños y deben ser objeto especial de tratamiento. Se insiste en proteger bien la cosecha madura porque su ataque es explosivo, pudiendo desarrollarse la larva en tan sólo 3-4 días.

Los tratamientos deben combinarse con medidas profilácticas para que éstos resulten eficaces, de no ser así, se observará fruta dañada. Debe recolectarse intentando no dejar fruta sin cosechar ni en el árbol, ni en el suelo para que no se reproduzca en ella la *Drosophila*. Los tratamientos cebo no funcionan contra esta plaga por lo que la aplicación debe ser generalizada a todo el árbol.

Puesta de *Drosophila suzukii*

Fotografías
Dr. Martin Hauser, Carolina, Departamento de Alimentación y Agricultura, Sacramento (US)

Materias activas *: *sales potásicas de ácidos grasos c14-c20, spinetoram, spinosad y piretrinas 4,65%.*
Se debe mojar bien todo el árbol con un volumen de caldo recomendado entre 800-1.000 l/ha según tamaño de los árboles.

(*) Al elegir un formulado de cualquiera de estas materias activas se prestará especial atención a los usos y dosis autorizadas, así como a las condiciones de uso y manipulación.
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp

Silla (Valencia), 25 de abril de 2023