



# TRACTAMENT CONTRA LA NECROSI FOLIAR DEL CAQUI

## *Plurivorosphaerella nawae* (= *Mycosphaerella nawae*)

Els tractaments fungicides hauran de programar-se per a cobrir el **PERÍODE DE RISC D'INFECCIÓ**, que es defineix a partir de la disponibilitat d'inòcul de *Plurivorosphaerella nawae*, la fenologia del caqui i les condicions climàtiques.

Considerant la disponibilitat d'inòcul de *P. nawae*, la fenologia del caqui i les condicions climàtiques, **ES RECOMANA INICIAR ELS TRACTAMENTS FUNGICIDES** en les plantacions de caqui contra la taca foliar, seguint les recomanacions generals i específiques establides en la nota informativa del passat 21 de març de 2024 ([per a veure-les punxar ací](#)).

Està disponible també el sistema automàtic per al seguiment del inòcul de *P. nawae* en totes les estacions meteorològiques de la xarxa SIAR de la Comunitat Valenciana. Amb aquesta eina es pot estimar, de forma més precisa, la disponibilitat d'inòcul en funció de les diferents zones productores.

Es pot accedir al sistema a través del següent link:

<http://gipcaqui.ivia.es/avisos-mycosphaerella>

És important seguir les recomanacions del passat 21 de març de 2024 referent al maneig de resistències que el fong *P. nawae* ha desenvolupat al grup de fungicides QoI (estrobilurines).

Silla (València) 2 d'abril de 2024

