TRATAMIENTO CONTRA LA NECROSIS FOLIAR DEL CAQUI

Plurivorosphaerella nawae (=Mycosphaerella nawae)

Los tratamientos fungicidas deberán programarse para cubrir el **PERÍODO DE RIESGO DE INFECCIÓN**, que se define a partir de la disponibilidad de inóculo de *P. nawae*, la fenología del caqui y las condiciones climáticas.

Considerando la disponibilidad de inóculo de *Plurivorosphaerella nawae,* la fenología del caqui y las condiciones climáticas, **SE RECOMIENDA INICIAR LOS TRATAMIENTOS FUNGICIDAS** en las plantaciones de caqui contra la mancha foliar, siguiendo las recomendaciones generales y específicas establecidas en la nota informativa del pasado 22 de marzo de 2023 (para verlas pinchar aquí)

Está disponible también el sistema automático para el seguimiento del inóculo de *Plurivorosphaerella nawae* en todas las estaciones meteorológicas de la red SIAR de la Comunitat Valenciana. Con esta herramienta se puede estimar, de forma más precisa, la disponibilidad de inóculo en función de las distintas zonas productoras.

Se puede acceder al sistema a través del siguiente link:

http://gipcaqui.ivia.es/avisos-mycosphaerella

Es importante seguir las recomendaciones del pasado 22 de marzo de 2023 en lo referente al manejo de resistencias que el hongo *P. nawae* ha desarrollado al grupo de fungicidas QoI (estrobilurinas).

Silla (Valencia), 11 de abril de 2023

GENERALITAT VALENCIANA