



# Ametler

## *Danys en tronc i branques*

S' estan detectant ametlers amb troncs o branques de bona mida que presenten un abultament i en alguns casos la corfa clivellada. Amb el temps, la part superior de la zona afectada s' asseca.



En tallar la branca a aquesta alçada apareixen els teixits necrosats. Aquests problemes solen ser deguts a fongs que a poc a poc colonitzen els teixits, de manera que impedeixen el transport de fluids en el xilema i el floema. Aquest tipus de fongs necessita alguna ferida a la corfa per penetrar a la planta.

Per l'altura a la qual estan els abultaments, aquestes ferides poden estar produïdes per maquinària de recol·lecció amb ventalls recol·lectors que tinguin la part de subjecció a l'arbre transmissora de la vibració en mal estat de manteniment, amb falta de protecció, de manera que en vibrar causen ferides a la corfa que afavoreixen l'entrada dels fongs, al mateix temps que faciliten la seva transmissió d' un arbre a un altre.

És molt important, per tant, cuidar el manteniment dels ventalls de recol·lecció, especialment la part que subjecta el tronc/branca que transmet la vibració a l'arbre; el revestiment protector ha d' estar en bones condicions. Una altra mesura addicional que podem prendre és la desinfecció de la part del ventall que entra en contacte amb l'arbre, evitant la transmissió entre parcel·les.



Servei de Sanitat vegetal, 14 d' agost de 2023

