

## Vespeta de l'ametler *Eurytoma amygdali*

S'observa la presència d'adults en ametles afectades de la campanya passada **en totes les zones**.

Després de l'eixida d'adults ha de fer-se un tractament amb algun dels plaguicides permesos en les condicions que indica l'etiqueta corresponent. És important **fer el tractament al cap de 4-5 dies de les primeres eixides d'adults**, per això hem de detectar eixes primeres eixides en la nostra explotació mitjançant un evolucionari amb ametles afectades.

Per a ajustar el moment de l'eixida d'adults a l'explotació, s'ha de portar el seguiment de la manera més individualitzada possible.

**Fitosanitaris autoritzats** per a tractaments contra la vespa de l'ametler:

- Lambda-cihalotrina 1,5 %, 2,5 % i 10 %
- Oli de parafina 79 %
- Piretrines 4 % (ha de comprovar-se que la formulació està autoritzada per a este ús)
- Tau-fluvalinato 24% (Autorització excepcional per Resolució de 31 de març de 2026 de la Direcció General de Sanidad de la Producció Agroalimentaria y Bienestar Animal. MAPA)

El tractament ha de fer-se transcorreguts 4-5 dies des de les primeres eixides.



Ametla amb orifici d'eixida



Adult dins d'ametla fent l'orifici d'eixida

Silla (València), 10 d'abril de 2026