



Xylella fastidiosa Control de vectors (nimfes sobre vegetació espontània)

Com a actualització de dades de l'avis de data 4 de març de 2025 ([accedir l'avis](#)), s'informa que en les dos àrees de zones altes i en la intermèdia de Tàrbena-Guadalest no s'han observat encara espumes de cap mena, mentres que en les dos de costes hi ha presència d'espumes de tipus A i B de les nimfes dels insectes vectors.

En la zona intermèdia de Vall d'Orba-Vall del Pop ja l'evolució de les espumes de les nimfes arriba majoritàriament al tipus C, quedant un xicotet percentatge encara del tipus B.

Els nivells de població són molt baixos i la seua presència és escassa, segurament a causa del brusc descens de població observat la passada campanya i a les particulars condicions climàtiques/pluviomètriques d'estes setmanes.

S'adjunta taula resum de les últimes dades disponibles

ZONES		ALTES		INTERMÈDIES		COSTES	
		VALL D'ALCALA - VALL DE GALLINERA	VALL DE SETA	VALL D'ORBA - VALL DEL POP	TÀRBENA - GUADALEST	COSTA MARINA ALTA	COSTA MARINA BAIXA
% ESPUMES	Tipus A	-	-	0	-	85	31
	Tipus B	-	-	11	-	15	69
	Tipus C	-	-	89	-	-	-
DATA DE SEGUIMENT		12/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	19/03/2025

Les actuacions a realitzar sobre la vegetació espontània són:

- Conreu del sòl: mitjançant labors superficials del sòl, de no més d'uns 5 cm per a no afectar les arrels del cultiu, però suficient com per a produir la birba de la vegetació espontània i la seua incorporació al sòl.
- Desbrossament de la vegetació: si no és possible el conreu haurà de realitzar-se un desbrossament, mecànic o manual de la vegetació espontània, i la seua preferent incorporació al sòl.
- Control químic: quan no siga possible cap de les accions anteriors, podran emprar-se herbicides contra esta vegetació.



Nimfes i espumes de tipus C

Un mecanisme indirecte de control és reduir l'atracció del cultiu per a l'insecte adult quan este migre de la vegetació espontània al cultiu. Per a això, totes les mesures culturals han de procurar un creixement equilibrat evitant un vigor excessiu, especialment mitjançant bones pràctiques de gestió de poda, fertilització i reg (si és el cas).

Per a més informació sobre el maneig dels vectors de *Xylella fastidiosa* pot consultar-se la nota informativa:

[Xylella fastidiosa, abril 2018](#)

La Zona Demarcada pot consultar-se en el link:

[Xylella fastidiosa - Portal Agrari - Generalitat Valenciana](#)

Silla (València), 26 de març de 2025

