

'Canetera'

SINONIMIAS: 'Canetí', 'Llusio', 'Nana' y 'Seniera'.

ORIGEN: localidad castellanense de Canet Lo Roig.

DIFUSIÓN: distribuida principalmente por el Baix Maestrat y la Plana Alta.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

• **Aptitud:** Aceite

• **Alternancia productiva:** Baja

Producción (promedio 5-8 años): 19,27 Kg/árbol

• **Índices de Productividad** (acumulado 5-8 años):

○ **Eficiencia productiva:** 2,86 Kg/m³ de copa

○ **Productividad:** 0,43Kg/cm² de sección de tronco

○ **Índice de cosecha:** 8,17 Kg/m² de superficie de copa

• **Entrada en producción:** 5,86 Kg al 3º año

• **Tres primeras cosechas acumuladas:** 19,92 Kg

• **Fecha media Plena Floración:**

9 de mayo (26 abril-22 mayo)

• **Fecha media Maduración** (en violeta):

22 de noviembre (5 octubre - 15 diciembre)

• **Peso del fruto(g):** 2,82 ± 1,48

• **Relación pulpa/hueso:** 6,28 ± 2,39

• **Fuerza retención fruto(g):** 723 ± 53

• **Árbol:** vigor bajo a medio, porte erguido y copa espesa.

• **Volumen a los 9 años:** 23,09 m³

• **Dificultad de la poda de formación:** fácil

• **Dificultad de la poda de producción:** fácil

• **Capacidad de enraizamiento:** Elevada

• **Características del aceite:** Aceite de calidad media con un contenido alto en oléico, elevada estabilidad y contenido en polifenoles medio abajo. Buena extractabilidad. Con afrutado verde, aroma a almendra y plátano.

○ **Rendimientos grasos (%):**

Sobre Materia Seca: 44,55 ± 4,84

Sobre Materia Natural: 19,91 ± 2,85

Rendimiento Industrial Teórico: 14,01 ± 4,19

• **Tolerancia frente a:**

• **Heladas:** Baja

• **Sequía:** Baja


• **Repilo:** Media

• **Tuberculosis:** Media

• **Mosca del olivo:** Alta

• **Verticilium:** Baja

* Datos Banco Varietal (regadío) de "Casa Camp" Llíria (Valencia)



CANETERA



Sergio Paz Compañ

Servicio de Transferencia de Tecnología

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural