





BLACK DIAMOND



- ORIGEN** Variedad obtenida por la Sociedad Superior Farming (U.S.A.)
- ÁRBOL** Muy vigoroso y de porte medio.
- FLORACIÓN** Plena floración 50 % flores abiertas 25 de febrero, clasificada autoincompatible. Igualan en floración las variedades Black Gold, Catalina, Superior Angeleno, Black Amber.
- FRUTO** Muy grueso, forma esférica, un poco aplastada. Color de la piel violeta oscuro. Pulpa de color rosa. Posibilidades de conservación en frío.
- EPOCA MADURACIÓN** Segunda quincena del mes de julio.
- CONSIDERACIONES** Densidad de plantación 450 - 550 plantas por hectárea según el sistema de poda a emplear. En frutos el color exterior de la piel induce a recolectarla antes de que estén maduros. En una o dos pasadas se recolecta la totalidad de la producción.
- VALORACIÓN ORGANOLEPTICA** Aspecto muy bueno, color bueno, textura de aceptable a dura. Sabor bueno.



FECHA RECOLECCIÓN	PESO (gr.)	CALIBRE	TEXTURA Kg/cm	% BRIX	ACIDEZ gr/l ac. cit.	ÍNDICE MADUREZ
25 - 7	97,26	55,28	1,885	14,7	10,88	1,35

AÑO	INICIO FLORACIÓN	PLENA FLORACIÓN 50%	CAÍDA PÉTALOS
1995	17 - 2	25 - 2	12 - 3

PRODUCCIÓN TOTAL ÁRBOL	EDAD	DESTRÍO	CALIBRE 4	CALIBRE 5	CALIBRE 6	CALIBRE 7 EXTRA	CALIBRE 7,5
73,400	5 AÑOS				1,900	42,5	67,96
PORCENTAJE					2,6	5,8	92,6



BLACK GOLD



ORIGEN	Variedad obtenida por la Superior Farming (U.S.A.)
ÁRBOL	De porte medio y poco vigoroso cuando se le deja en los primeros años gran cantidad de frutos.
FLORACIÓN	Plena floración 50 % flores abiertas 24 febrero. Igualan en floración las variedades Catalina, Black Diamond, Superior Angeleno, Black Amber.
FRUTO	Calibre grueso, forma esférica, color de la piel negra-violácea y carne roja consistente. Aguanta manipulación y transporte. Posibilidades de conservación en frío.
EPOCA MADURACIÓN	Primera semana de julio. Entrada en producción muy rápidamente.
CONSIDERACIONES	Densidad de plantación 650 - 750 árboles por hectárea y según el sistema de poda a emplear. En una o dos pasadas puede recolectarse la totalidad de la producción.
VALORACIÓN ORGANOLEPTICA	Aspecto y color muy bueno. Sabor bueno.



FECHA RECOLECCIÓN	PESO (gr.)	CALIBRE	TEXTURA Kg/cm	° BRIX	ACIDEZ gr/l ac. cit.	ÍNDICE MADUREZ
7 - 7 - 95	90,33	52,90	2,660	12,4	12,67	0,97

AÑO	INICIO FLORACIÓN	PLENA FLORACIÓN 50%	CAÍDA PÉTALOS
1995	19 - 2	24 - 2	12 - 3

PRODUCCIÓN TOTAL ÁRBOL	EDAD	DESTRÍO	CALIBRE 4	CALIBRE 5	CALIBRE 6	CALIBRE 7 EXTRA	CALIBRE 7,5
48,02	4 AÑOS				0,61	2,660	44,740
PORCENTAJE					1,28	5,56	93,17



**OZARK
PREMIER**



- ORIGEN**
Variedad obtenida por R.H. Shepard de la Missouri State Fruit Experimental Station - Mountain Grove (U.S.A.), partiendo de cruzar las variedades Burbank y Methley y difundida comercialmente desde 1946.
- ARBOL**
Vigoroso y de porte caedizo.
- FLORACIÓN**
Plena floración 50 % flores abiertas 7 de marzo. Clasificada autoincompatible. Iguales en floración las variedades Wickson, Bella di Barbiano, Golden Japan, Laroda.
- FRUTO**
Muy grueso de forma elipsoidal y un poco asimétrico de piel roja con fondo amarillo-verdoso; pulpa amarillo-claro consistente, con facilidad para desprenderse del hueso, buena manipulación y transporte, posibilidades de conservación en frío.
- EPOCA MADURACIÓN**
De finales de junio a principios de julio.
- CONSIDERACIONES**
Maduración escalonada por lo que necesita tres pasadas para recolectar la totalidad de la producción. Densidad de plantación 450 - 550 plantas por hectárea según el sistema de poda a emplear.
- VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA**
Aspecto y color aceptable. Textura de aceptable a dura. Sabor suficiente.



FECHA RECOLECCIÓN	PESO (gr.)	CALIBRE	TEXTURA Kg/cm	* BRIX	ACIDEZ gr/100 ac. cíl.	ÍNDICE MADUREZ
29 - 6	102	58,12	1,720	11,6	15,10	0,76

AÑO	INICIO FLORACIÓN	PLENA FLORACIÓN 50%	CAÍDA PÉTALOS
1995	28 - 2	7 - 3	20 - 3

PRODUCCIÓN TOTAL ÁRBOL	EDAD	DESTRÍO	CALIBRE 4	CALIBRE 5	CALIBRE 6	CALIBRE 7 EXTRA	CALIBRE +7
65,90	5 VERDES					2,53	63,36
PORCENTAJE						3,85	96,15



BLACK AMBER



ORIGEN

Estados Unidos, obtenida por J.H. Weimberger en la U.S. Horticultura Field Station, en Fresno, a partir del cruce Queen Rosa y Friar.

ARBOL

Vigoroso y de porte muy erecto.

FLORACIÓN

Plena floración 50 % de flores abiertas 28 de febrero, sus flores no son autofértiles. Igualan en floración las variedades Black Beaut, Queen Rosa, Sierra Plum, Black Gold, Catalina.

FRUTO

Color negro, tamaño grueso, forma del fruto redondo un poco achatado. Pulpa color ámbar, carne firme no adherente al hueso. Resistente a la manipulación. Productivo.

ÉPOCA MADURACIÓN



Ultima semana de junio.

CONSIDERACIONES

Factores a tener en cuenta: el marco de plantación 800 - 900 árboles por hectárea y el sistema de poda a emplear. Entre una o dos pasadas se recolecta la totalidad de la producción.

VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA

Aspecto y color bueno. Sabor bueno.



FECHA RECOLECCIÓN	PESO (gr.)	CALIBRE	TEXTURA Kg/cm	* BRIX	ACIDEZ gr/l ac. cit.	ÍNDICE MADUREZ
29 - 6 - 95	66,66	49,52	1.670	9,6	13,57	0,71

AÑO	INICIO FLORACIÓN	PLENA FLORACIÓN 50%	CAÍDA PÉTALOS
1995	19 - 2	28 - 2	9 - 3

PRODUCCIÓN TOTAL ÁRBOL	EDAD	DESTRÍO	CALIBRE 4	CALIBRE 5	CALIBRE 6	CALIBRE 7 EXTRA	CALIBRE +7
57,660	5 AÑOS		1,180	1,980	4,100	5,140	45,260
PORCENTAJE			2	3,4	7,1	8,9	78,5